

# ШИЗОФРЕНИЯ. КВАНТОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ С ЗАДАНИЯМИ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ. Для студентов медицинских вузов

**Кайратбек Сарсембаев,**  
профессор, доктор медицинских наук,  
<kairatbek60@gmail.com>

## Определение

Шизофрения — это эндогенное хроническое психическое заболевание с прогредиентным течением. Заболевание проявляется типичными изменениями личности больного и различными по степени выраженности психическими расстройствами, которые приводят к снижению качества жизни с последующей утратой трудоспособности и социальной адаптации. Термин «шизофрения» впервые предложил известный швейцарский психиатр Э. Блейлер в 1911 году.

## Распространённость

По данным эпидемиологических исследований, проведённых в различных регионах мира, распространённость шизофрении составляет в среднем 1% населения. В странах с жарким климатом чаще наблюдаются острые формы заболевания, в отличие от стран с холодным климатом.

## Возраст

Шизофрения может начаться в любом возрасте. Наиболее типичный возрастной период для начала развития шизофрении детско-подростковый. В возрасте до 20 лет чаще заболевают мальчики, а старше 20 лет — девочки. У женщин заболевание протекает более остро. После 25 лет заболеваемость шизофренией снижается.

## Клиника шизофрении

Все многообразие клинической симптоматики шизофрении можно сгруппировать по симптомам позитивных и негативных проявлений заболевания.

Методика

Методика

ПЕД	
	измерения

### Позитивные симптомы

Они отражают психопатологическую симптоматику заболевания и подразделяются на непсихотические и психотические расстройства.

### Негативные симптомы

Характеризуют утрату личностью своих индивидуальных психических качеств. Наблюдается нарушение мышления, проявляющееся в бесплодном рассуждательстве, аморфности, парадоксальности и противоречивости суждений. Деятельность больных становится неэффективной, странной и необъяснимой для окружающих.

Волевые действия теряют целенаправленность и понятность для окружающих. Эмоции утрачивают единство с мышлением, действиями больного и не отражают всего внутреннего содержания его психической деятельности.

При шизофрении выздоровления не бывает, наступает лишь ремиссия.

### Непсихотические проявления

Непсихотические проявления шизофрении включают астенические, фобические, навязчивые, истерические, сенестопатические, ипохондрические,

поведенческие расстройства психической деятельности. Также в клинике шизофрении довольно значительное место занимают психотические расстройства, которые включают аффективные, галлюцинаторные, бредовые, кататонические расстройства и онейроидное помрачение сознания.

### Клиническая динамика шизофрении

Заболевание отличается многолетним хроническим течением, протекающим непрерывно или приступами.

*Непрерывное течение* шизофрении является неблагоприятным и может развиваться злокачественно в течение 3–5 лет, приводя больного к тяжёлому дефекту личности, с полной социально-трудовой дезадаптацией. При этом больные апатичны, бездеятельны, безучастны, мышление разорванное, лишено логической связи.

### Возможность и формы продуктивных расстройств

Наряду с этими негативными проявлениями заболевания могут сосуществовать и продуктивные расстройства в фор-

ме галлюцинаций, бреда, психомоторного возбуждения. Такой исход может иметь место и в более отдаленные сроки, при менее злокачественном течении шизофрении.

Вместе с тем и при непрерывном течении заболевания может быть благоприятный исход с менее выраженными негативными проявлениями. Это имеет место, когда болезненный процесс проявляется симптомами неглубокого поражения психики — непсихотическими расстройствами.

### **Приступообразное течение шизофрении**

Оно характеризуется чередованием приступов болезни со светлыми промежутками. Клиническая картина приступов отражает остроту заболевания. Психопатологическая симптоматика характеризуется полиморфностью.

### **Задания**

*Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два и большее количество правильных ответов. Нажимайте на клавиши с номерами всех правильных ответов.*

#### **1. ШИЗОФРЕНИЯ — ЭТО**

- 1) хроническое психическое заболевание
- 2) эндогенное психическое заболевание
- 3) острое психическое заболевание
- 4) неprogredientное течение
- 5) progredientное течение

В структуре приступов галлюцинаторные, бредовые, кататонические проявления обычно сочетаются с аффективной напряженностью больного — депрессией, страхом, растерянностью, тревогой.

На высоте приступа может развиваться онейроидное расстройство сознания. Приступообразное течение шизофрении является благоприятным, так как приводит к менее выраженным изменениям личности больных. Однако если приступы будут учащаться, то изменение личности будет усиливаться. В среднем у больного в течение жизни наблюдается 2–3 приступа.

### **Возможны варианты**

Возможны переходы непрерывного течения в приступообразное, а также приступообразного течения в непрерывное.

**Методика****Методика**

ПЕД  
измерения

- 6) выздоровление
- 7) ремиссии

## 2. ПОЗИТИВНЫЕ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ

- 1) помрачение сознания
- 2) сенестопатические
- 3) ипохондрические
- 4) галлюцинаторные
- 5) кататонические
- 6) поведенческие
- 7) астенические
- 8) аффективные
- 9) истерические
- 10) навязчивые
- 11) бредовые

## 3. НЕГАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ

- 1) помрачения сознания
- 2) сенестопатические
- 3) ипохондрические
- 4) галлюцинаторные
- 5) кататонические
- 6) поведенческие
- 7) астенические
- 8) аффективные
- 9) истерические
- 10) навязчивые
- 11) бредовые

## 4. В КАКОМ ГОДУ Э.БЛЕЙЛЕР ПРЕДЛОЖИЛ ТЕРМИН «ШИЗОФРЕНИЯ»

- 1) 1899
- 2) 1901
- 3) 1909
- 4) 1911
- 5) 1912
- 6) 1915
- 7) 1920

## 5. К {позитивным, негативным} СИНДРОМАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) помрачения сознания
- 2) сенестопатические
- 3) ипохондрические
- 4) галлюцинаторные
- 5) кататонические
- 6) поведенческие
- 7) астенические
- 8) аффективные
- 9) истерические
- 10) навязчивые
- 11) бредовые

## 6. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЙ ВОЗРАСТ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ

- 1) детско-подростковый
- 2) ранний подростковый
- 3) ранний детский
- 4) подростковый
- 5) пубертатный
- 6) старческий
- 7) юношеский
- 8) пожилой

**7. ПРИ ШИЗОФРЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ СТАНОВИТСЯ**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1) нецеленаправленной | 7) продуктивной |
| 2) интеллектуальной   | 8) осмысленной  |
| 3) непродуктивной     | 9) непонятной   |
| 4) неэффективной      | 10) осознанной  |
| 5) необъяснимой       | 11) странной    |
| 6) необъяснимой       |                 |

**8. ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ТИПЕ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) социально-трудова дезадаптация больного
- 2) социально-трудова адаптация больного
- 3) благоприятный исход заболевания
- 4) неблагоприятный исход заболевания
- 5) незначительный дефект личности
- 6) выраженный дефект личности
- 7) улучшение качества жизни

**9. ПРИСТУПООБРАЗНЫЙ ТИП ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) отсутствием светлых промежутков между приступами
- 2) полиморфностью психопатологических проявлений
- 3) однообразием психопатологических проявлений
- 4) остротой психопатологических проявлений
- 5) чередованием приступов заболевания
- 6) злокачественностью течения
- 7) благоприятным исходом

**10. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИСТУПОВ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СИНДРОМАМИ**

- 1) психоорганических расстройств
- 2) галлюцинаторных расстройств
- 3) психосенсорных расстройств
- 4) кататонических расстройств
- 5) аффективных расстройств
- 6) астенических расстройств
- 7) мнестических расстройств
- 8) фобических расстройств
- 9) бредовых расстройств
- 10) судорожных расстройств

Методика

Методика

ПЕД  
измерения

#### 11. ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВКЛЮЧАЮТ СИНДРОМЫ

- 1) галлюцинаторные
- 2) ипохондрические
- 3) психосенсорные
- 4) кататонические
- 5) маниакальные
- 6) истерические
- 7) аффективные
- 8) астенические
- 9) онейроидные
- 10) депрессивные
- 11) обсессивные
- 12) фобические
- 13) бредовые

#### 12. В КРУГ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ВХОДЯТ СИНДРОМЫ

- 1) психического автоматизма
- 2) амбулаторного автоматизма
- 3) галлюцинаторные
- 4) ипохондрические
- 5) психосенсорные
- 6) кататонические
- 7) маниакальные
- 8) истерические
- 9) аффективные
- 10) астенические
- 11) онейроидные
- 12) депрессивные
- 13) обсессивные
- 14) фобические
- 15) бредовые

*Дополнить:*

13. ТЕРМИН «ШИЗОФРЕНИЯ» ПРЕДЛОЖИЛ \_\_\_\_\_ .